

Principaux diurétiques							
Classe	DCI et spécialités	Posologie	Effets secondaires		Précautions et CI	Demi-vie	Elimination urine/fèces
			fréquents	rares			
Diurétiques de l'anse	Furosémide (Lasilix®)	20 à 60 mg/j	hypokaliémie hyperuricémie hyperglycémie	hyponatrémie deshydratation ototoxicité néphotoxicité torsade de Pointe	restriction sodée apport de K <sup>+</sup> adjoindre épargneur de K <sup>+</sup> goutte antibiotiques ototoxiques	50 min	Urinaire prépondérante, sous forme active
	Bumétanide (Burinex®)	1 à 20 mg/j				90 min	Urinaire prépondérante (65% sous forme inchangée)
	Pirétanide (Eurelix®)	6 mg/j				60 min (voie orale) 40 min (voie IV)	Urinaire prépondérante (80% sous forme inchangée)
Diurétiques thiazidiques et apparentés	Hydrochlorothiazide (Esidrex®)	12,5 à 100 mg/j	hypokaliémie hyperglycémie hyperuricémie	hyponatrémie deshydratation torsade de pointe hypotension orthostatique Alcalose	diabète goutte atteinte hépatique QT long insuffisance rénale	très variable d'un sujet à l'autre (6 à 25 heures)	Urinaire prépondérante (85% sous forme inchangée)
	Ciclétanine (Tenstaten®)	50 à 150 mg/j				5 à 8 heures	Urinaire prépondérante (1% sous forme inchangée)
	Indapamide (Fludex®)	2,5 mg/j LP : 1,5 mg/j				18 heures (14 à 24 heures)	Urinaire prépondérante (60 à 80% dont 1% sous forme inchangée)
Diurétiques anti-aldostérone et épargneurs de potassium	Spironolactone (Aldactone®)	25 à 150 mg/j	hyperkaliémie gynécomastie	hyponatrémie impuissance acidose	insuffisance rénale insuffisance hépatique IEC diabète	10 min (10 à 35 heures pour les métabolites)	Urinaire (31% sur 5 jours) / fèces (22% sur 5 jours) sous forme de métabolites
	Éplérénone (Inspra®)	25 à 50 mg/j				3 à 5 heures	Urinaire prépondérante (67%). moins de 5% sous forme inchangée
	Canrénoate de potassium (Soludactone®)	200 à 600 mg/j				Moins d'1 heure à 43 heures selon métabolites	Urinaire prépondérante (47% sur 5 jours)

	Amiloride (Modamide®)	5 à 20 mg/j				6 heures	Urinaire sous forme inchangée
<b>Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique et diurétiques osmotiques</b>	Acétazolamide (Diamox®)	1 à 2 g/j	irritation et inflammation veineuse locale. En fonction de la dose : troubles électrolytiques	céphalées, nausées, vomissements	insuffisance cardiaque, congestion pulmonaire, déshydratation profonde, hémorragie intracrânienne, obstruction des voies urinaires efférentes	5 heures	Urinaire sous forme inchangée
	Mannitol (Mannitol Biosedra® 20%)	50 à 100 g /j				100 min	Urinaire sous forme inchangée
<b>Associations de diurétiques</b>	altizide + spironolactone (Aldactazine®)	A : 15 à 30 mg/j S : 25 à 50 mg/j	hyperglycémie hyperuricémie hypokaliémie	hyponatrémie hyperkaliémie deshydratation impuissance gynécomastie	diabète goutte QT long insuffisance rénale insuffisance hépatique	Altizide : 5 à 8 heures	Altizide : urinaire sous forme inchangée
	Furosémide + spironolactone (Aldalix®)	F : 20 à 40 mg/j S : 50 à 100 mg/j				Cf. ci-dessus	Cf. ci-dessus
	methylclothiazide + triamtérène (Isobar®)	M : 2,5 à 5 mg/j T : 75 à 150 mg/j				Methylclothiazide : 5 à 8 heures Triamtérène : 2 à 4 heures	Methylclothiazide : urinaire sous forme inchangée Triamtérène : urinaire
	furosémide + amiloride (Logirene®)	F : 40 à 80 mg/j A : 5 à 10 mg/j				Cf. ci-dessus	Cf. ci-dessus
	hydrochlorothiazide + amiloride (Moduretic®)	H : 25 à 200 mg/j A : 2,5 à 20 mg/j				Cf. ci-dessus	Cf. ci-dessus
	hydrochlorothiazide + triamtérène (Prestole®)	H : 25 mg/j T : 50 mg/j				Cf. ci-dessus	Cf. ci-dessus

CI : contre-indication | Gél : gélule | Amp : ampoule | Cp : comprimé