

Boletus satanas




Toxique



Spore Brun olive

Ordre :	Boletales
Genre :	<i>Boletus</i>
Caractéristiques du genre :	Hyménophore à tubes longs, mous, facilement séparable de la chair. Stipe robuste à obèse.
Sporée :	Brun olive.

Galerie



Description

Chapeau :	De 10 à 25 cm de diamètre. Blanc, grisâtre sale, velouté.
Chair :	Épaisse, blanchâtre, peu bleuisse. Odeur forte, écœurante.
Hyménophore :	Tubes jaunes, puis vite rouges. Pores jaunes, fins, réguliers.
Pied :	Court, trapu à obèse. Coloration sang et or vers le chapeau. Fin réseau rouge sur le quart supérieur.
Anneau :	Sans.
Volve :	Sans.
Habitat :	Sous chênes, taillis ou clairières. Sol calcaire. Plutôt thermophile.
Période de cueillette :	Été et automne

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Confusions : *Boletus calopus* / Bolet à beau pied ; *Boletus dupainii* / Bolet de Dupain ; *Boletus erythropus* / Bolet à pied rouge ; *Boletus luridus* / Bolet blafard ; *Boletus rhodoxanthus* / Bolet rose et jaune.

Comestibilité : Toxique.

Syndrome associé : Résinoïdien : 30 minutes à 3 heures après. Nausées, vomissements, diarrhées, pertes hydro-ioniques importantes.

Conduite à tenir : Retour à la normale au bout de ¾ heures. Eventuellement hospitalisation avec

Remarques :

rééquilibrage hydroélectrolytique.

Des genres à lames existent en parallèle de ceux à tubes dans l'ordre des Bolétales :

Gomphidius ; *Paxillus* ; *Omphalotus* ; *Hygrophoropsis*.