

Cantharellus cibarius







Excellent comestible

Crème

Ordre : Cantharellales
Genre : *Cantharellus*
Caractéristiques du genre : Chair fibreuse. Hyménophore à plis.
Sporée : Crème.

Galerie



Description

Chapeau : De 3 à 15 cm de diamètre. Jaune orangé plus ou moins pâle. Convexe puis déprimé. Marge enroulée chez l'individu jeune s'étalant et ondulant chez le sujet âgé.

Chair : Crème et ferme. Odeur fruitée de mirabelle ou d'abricot.

Hyménophore : Plis espacés, anastomosés, concolores, fourchus près de la marge et près du pied. Nettement décurrents sur le pied.

Pied : Concolore. Plein et ferme.

Anneau : Sans.

Volve : Sans.

Habitat : Sous couvert de mousse, Chêne vert et conifères.

Période de cueillette : Du printemps à l'automne.

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Confusions : *Omphalotus olearius* / Clitocybe de l'olivier ; *Craterellus tubaeformis* / Chanterelle en tube ; *Cantharellus lutescens* / Chanterelle jaunissante ; *Hygrophoropsis aurantiaca* / Hygrophoropsis (=clitocybe) orangé ; *Paxillus involutus* / Paxille enroulé.

Comestibilité : Excellent comestible.

Remarques : Très recherchée. Ramassage intensif parfois réglementé dans certaines régions. Bien faire

cuire sa chair ferme. Ne pas la ramasser avec des instruments pour permettre une repousse plus abondante ensuite.