

# Cantharellus lutescens




Excellent comestible



Crème

Ordre :	Cantharellales
Genre :	<i>Cantharellus</i>
Caractéristiques du genre :	Chair fibreuse. Pied creux. Hyménophore lisse à sublisce.
Sporée :	Crème.

## Galerie



## Description

<b>Chapeau :</b>	De 2 à 5 cm de diamètre. Brun à brun bistre. D'abord convexe enroulé puis ombiliqué, parfois perforé. Marge ondulée à maturité.
<b>Chair :</b>	Très fine, Crème, fibreuse. Odeur de mirabelle et saveur douce.
<b>Hyménophore :</b>	Jaune pâle à jaune orangé. Surface fertile presque lisse ou légèrement veinée.
<b>Pied :</b>	Jaune orangé lumineux. Arrondi à aplati, creux, sillonné.
<b>Anneau :</b>	Sans.
<b>Volve :</b>	Sans.
<b>Habitat :</b>	En colonies importantes, plutôt calcicole, ou souvent dans les bruyères.
<b>Période de cueillette :</b>	Automne.

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

<b>Confusions :</b>	<i>Cantharellus cibarius</i> / Chanterelle comestible ; <i>Craterellus tubaeformis</i> / Chanterelle en tube ; <i>Leotia viscosa</i> / Léotie visqueuse.
<b>Comestibilité :</b>	Excellent comestible.
<b>Remarques :</b>	Elle est plus brillamment colorée que <i>Craterellus tubaeformis</i> . N'apprécie pas la sécheresse. Par contre se conserve très bien une fois séché.