

Collybia fusipes










Comestible




Blanche

Ordre : Agaricales
Genre : *Collybia*
Caractéristiques du genre : Chair fibreuse à texture cartilagineuse. Lames non libres. Sporee blanche ou très pâle.
Sporee : Blanche.

Galerie





Description

- Chapeau :** De 3 à 8 cm de diamètre. Blanc, puis rapidement brun rougeâtre se tachant de rouille. D'abord charnu et convexe, lisse à viscidulé, s'étale avec un mamelon plus ou moins net.
- Chair :** Tendre, puis cartilagineuse surtout dans le pied.
- Hyménophore :** Lames blanches puis se teintant entièrement de brun rouille. Adnées, espacées et irrégulières.
- Pied :** Brun rouille de forme caractéristique à la fois bombée et aplatie au centre. Etiré des 2 côtés. Fortement strié.
- Anneau :** Naissance d'un stipe radicant qui assure la survie du champignon pour plusieurs années.
- Volve :** Sans.
- Habitat :** En touffe surtout sur des souches ou des racines.
- Période de cueillette :** Été et automne.

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

- Confusions :** *Cortinarius orellanus* / Cortinaire couleur de Rocou ; *Laccaria lacata* / Laccaire laqué ; *Omphalotus olearius* / Clitocybe de l'olivier.
- Comestibilité :** Comestible.
- Remarques :** Se consomme jeune.

Seul le chapeau à l'état jeune est comestible comme champignon à soupe. Troubles digestifs provoqués par le pied fibreux et le champignon âgé.