

Cortinarius sanguineus






Toxique



Brun rouille

Ordre :	Agaricales
Genre :	<i>Cortinarius</i>
Caractéristiques du genre :	Terricole. Chair fibreuse. Lames adnées, ou échancrées. Voile partiel cortiniforme parfois fugace ou invisible.
Sporée :	Brun rouille.

Galerie



Description

Chapeau :	De 2 à 5 cm de diamètre. Rouge sang. Bassement mamelonné, couvert de squamules fibrilleuses.
Chair :	Rouge sang, un peu orangé vers le pied. Odeur raphanoïde. Ne pas goûter.
Hyménophore :	Lames rouge sang puis brunes.
Pied :	Rouge sang.
Anneau :	Cortine rouge sang très fugace.
Volve :	Sans.
Habitat :	Surtout sous épicéas et sapins. Lieux humides, sphaignes.
Période de cueillette :	De la fin de l'été jusqu'au milieu de l'automne.

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Confusions :	<i>Collybia fusipes</i> / Collybie à pied en fuseau ; <i>Cortinarius orellanus</i> / Cortinaire couleur de rocou ; <i>Laccaria lacata</i> / Laccaire laqué.
Comestibilité :	Toxique.
Syndrome associé :	Cortinarien : 3 à 20 jours après ingestion. Soif intense, sécheresse buccale, polyurie puis insuffisance rénale aigüe parfois mortelle.
Conduite à tenir :	Rééquilibrage hydroélectrolytique, hémodialyse et éventuellement greffe rénale.