

# Craterellus tubaeformis






Bon comestible



Blanche

Ordre :	Cantharellales
Genre :	<i>Craterellus</i>
Caractéristiques du genre :	Chair fibreuse. Pied creux. Hyménophore lisse à sublisse.
Sporée :	Crème.

## Galerie



## Description

**Chapeau :**

De 2 à 6 cm de diamètre. Surface jaune fauve à brune, finement pelucheuse. Nettement creusé en entonnoir avec l'âge. Marge d'abord enroulée puis relevée et festonnée à maturité.

**Chair :**

Très mince, souple, légèrement élastique. Odeur légère de terre.

**Hyménophore :**

Plis anastomosés, fourchus près de la marge, épais et espacés. (Jaunes ternes chez le sujet jeune, grisonnant à maturité.)

**Pied :**

Cylindrique, à plat irrégulièrement bosselé. Cavité communicant avec le chapeau par un

**Anneau :** opercule. Jaune puis grisonnant.  
**Volve :** Sans.  
**Habitat :** Endroits humides, sphaignes. En troupes.  
**Période de cueillette :** Périodes plutôt froides.

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

**Confusions :** *Cantharellus cibarius* / Chanterelle comestible ; *Cantharellus lutescens* / Chanterelle jaunissante ; *Craterellus cornucopioides* / Trompette des mort ;

*Cortinarius cinnamomeus* / Cortinaire cannelle ; *Leotia lubrica* / Léotie lubrique.

**Comestibilité :** Bon comestible.

**Remarques :** Moins prisé que *Cantharellus cibarius* / Chanterelle comestible. Chair un peu élastique convenant à des omelettes. Supporte bien la dessiccation.