

Galerina marginata







Mortel



Brun rouille foncée

Ordre :	Amanitales
Genre :	<i>Galerina</i>
Caractéristiques du genre :	Chair fibreuse. Lames non libres. Chapeau souvent hygrophane.
Sporée :	Brun rouille foncé.

Galerie



Description

Chapeau :	De 3 à 5 cm de diamètre. D'abord campanulé puis plus ou moins mamelonné. Hygrophane. Brun fauve à jaune miel par temps sec. Marge légèrement striée.
Chair :	Mince et fragile. Plutôt brune. Odeur farineuse. Ne pas goûter.
Hyménophore :	Jaunes à brun pâle. Lames adnées et étroites.
Pied :	Assez long et grêle (5 à 8 cm). Pâle au dessus de la zone annulaire et brun chiné au dessous.
Anneau :	Cortinarien, un peu membraneux, coloré par les spores. Fugace et vite apprimé.

Volve : Sans.
Habitat : Isolé, à grégaire, rarement en petites touffes, surtout sur souches .
Période de cueillette : Été et automne.

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Confusions : *Kuehneromyces mutabilis* / Pholiote changeante ; *Flammulina velutipes* / Collybie à pied velouté ; *Hypholoma capnoides* / Hypholome à lames enfumées ;

Hypholoma fasciculare / Hypholome en touffes ; *Hypholoma sublateritium* / Hypholome couleur de brique.

Comestibilité : Mortel.

Syndrome associé : Phalloïdien : Six à vingt quatre heures après l'ingestion apparaissent vertiges et gênes respiratoires. Puis gastro-entérites aiguë, rémission apparente et atteinte hépatique avec cytolyse.

Conduite à tenir : Réhydratation, lavage gastrique, respect des diarrhées, diurèse aqueuse forcée, pénicilline G, N acétyl cystéine (précurseur du glutathion) et épuration extra rénale si hépatite grave. Suivi des enzymes hépatiques. Dosage des amanitines et des phallotoxines possible par techniques radio-immunologique.

Remarques : Attention à la grande confusion avec *Kuehneromyces mutabilis* / Pholiote changeante. Confusion responsable de plusieurs décès.