

Kuehneromyces mutabilis






Bon comestible



Brune

| | |
|-----------------------------|--|
| Ordre : | Agaricales |
| Genre : | <i>Kuehneromyces</i> |
| Caractéristiques du genre : | Chair fibreuse. Lames non libres. Lignicole, chapeau hygrophane. |
| Sporée : | Brune. |

Galerie



Description

| | |
|--------------------------------|---|
| Chapeau : | De 3 à 8 cm de diamètre. Convexe puis étalé, charnu au centre avec présence d'un mamelon. Hygrophane. Brun à miel jaunâtre à partir du centre. |
| Chair : | Molle dans le chapeau et fibreuse dans le pied. Blanche à jaunâtre. Odeur douce, saveur fongique. |
| Hyménophore : | Lames adnées à légèrement décurrentes. Jaune pâle à brun rouille. |
| Pied : | Partie supérieure jaune striée, et partie inférieure recouverte d'une armille hérissée de mèches écailleuses brunes. Allongé et sinueux. Grêle et tenace. |
| Anneau : | Membraneux persistant, mais fragile. |
| Volve : | Sans. |
| Habitat : | Cespiteux sur les souches de feuillus et plus rarement de conifères (épicéas). |
| Période de cueillette : | Du printemps jusqu'aux 1ères gelées. |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| | | | | | | | | | | | |

Confusions : *Flammulina velutipes* / Collybie à pied velouté ; *Galerina marginata* / Galère marginée ; *Hypholoma capnoides* / Hypholome à lames enfumées ; *Hypholoma fasciculare* / Hypholome en touffe ; *Hypholoma sublateritium* / Hypholome couleur de brique.

Comestibilité : Bon comestible.

Remarques : Champignon qui agrémentera les potages et sauces avec son parfum fruité. Utiliser les chapeaux des exemplaires jeunes seulement.