

# Lactarius vellereus






Mauvais mais pas toxique



Blanche

Ordre :	Russulales
Genre :	<i>Lactarius</i>
Caractéristiques du genre :	Chair cassante comme de la craie. Présence de latex (lait) à la cassure. Lames plus ou moins décurrentes.
Sporée :	Blanche.

## Galerie



## Description

<b>Chapeau :</b>	De 5 à 30 cm. Blanc velouté. Taché d'ocre avec l'âge. Marge enroulée.
<b>Chair :</b>	Blanche, ferme. Lait très abondant, immuable. Odeur faible, saveur âcre.
<b>Hyménophore :</b>	Lames décurrentes. Assez espacées. Étroites, plus ou moins fourchues.
<b>Pied :</b>	Court, concolore au chapeau.
<b>Anneau :</b>	Sans.
<b>Volve :</b>	Sans.

**Habitat :** En groupe.

**Période de cueillette :** De la fin de l'été jusqu'au milieu de l'automne.

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

**Confusions :** *Lactarius piperatus* / Lactaire poivré ; *Lactarius pergamenus* / Lactaire parcheminé.

**Comestibilité :** Mauvais mais pas toxique.

**Remarques :** Le lait âcre rend le champignon immangeable. Lait immuable à la potasse contrairement à *Lactarius pergamenus*. (devient orange).

Consommé en fines tranches grillées dans les pays de l'Est.