# Lepiota helveola

Mortel



Blanche

| | |
|---|---|
| Ordre : | Agaricales |
| Genre : | *Lepiota* |
| Caractéristiques du genre : | Chair fibreuse. Lames libres. Pied facilement séparable du chapeau. Sporée blanche. Présence d'un voile partiel. |
| Sporée : | Blanche. |

## Galerie

## Description

**Chapeau** : De 2 à 5 cm de diamètre. Calotte brun vineuse et squamules fines, concentriques brun rosé sur fond crème.

**Chair** : Mince, blanche, rosissant légèrement à la blessure. Odeur faible.

**Hyménophore** : Lames blanches ou rosâtres.

**Pied** : Chiné de roux ou rose vineux à la base.

**Anneau** : Membraneux fragile, presque cortiniforme.

**Volve** : Sans.

**Habitat** : Bois aérés, lisières et jardins.

**Période de cueillette** :

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |

**Confusions** : *Lepiota brunneoincarnata* / Lépiote brun rose ; *Lepiota brunneolilacea* / Lépiote brun lilas ; *Lepiota cristata* / Lépiote crêtée ; *Lepiota josserandii* / Lépiote de Josserand ; *Macrolepiota procera* / Lépiote élevée ; *Macrolepiota rhacodes* / Lépiote déguenillée.

**Comestibilité** : Mortel.

**Syndrome associé** : Phalloïdien : six à vingt quatre heures après l'ingestion apparaissent vertiges et gênes respiratoires. Puis gastro-entérite aiguë, rémission apparente et atteinte hépatique avec cytolyse.

**Conduite à tenir** : Réhydratation, lavage gastrique, respect des diarrhées, diurèse aqueuse forcée, pénicilline G, N acétyl cystéine (précurseur du glutathion) et épuration extra rénale si hépatite grave.

**Remarques** : Champignon rare mais apparitions plus fréquentes dans les Alpes et le Jura.

Toutes les petites lépiotes dites rougissantes sont considérées comme toxiques ou mortelles (moins de 10 cm).