

Macrolepiota rhacodes








Bon comestible



Blanche

Ordre :	Agaricales
Genre :	<i>Macrolepiota</i>
Caractéristiques du genre :	Chair fibreuse. Lames libres. Pied facilement séparable du chapeau. Sporee blanche. Présence d'un voile partiel coulissant à maturité. Chapeau squamuleux. Très robuste.
Sporée :	Blanche.

Galerie



Description

Chapeau :	De 8 à 15 cm de diamètre. Couvert d'écaillles très retroussées grises à beiges sur fond crème, presque laineux. Très charnu.
Chair :	Calotte discale étroite. Blanche, rougissante à la blessure. Tendre dans le chapeau et fibreuse dans le pied. Odeur faible, saveur de noisette.
Hyménophore :	Lames blanches, rougissantes au froissement. Fortement libres (collariées) et ventruées.
Pied :	Blanc à roux, brun à noircit en séchant. Lisse, creux, non chiné, légèrement strié cannelé. Se termine par un bulbe volumineux.
Anneau :	Coloré de marron foncé sur la face inférieure. Complexe, double et descendant.
Volve :	Sans.
Habitat :	Sous épicéas, surtout en lisière.
Période de cueillette :	Juillet à octobre.

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Confusions : *Lepiota brunneoincarnata* / Lépiote brun rose ; *Lepiota brunneolilacea* / Lépiote brun lilas ; *Lepiota cristata* / Lépiote crêtée ;

Lepiota helveola / Lépiote brune ; *Lepiota josserandii* / Lépiote de Josserand ; *Macrolepiota procera* / Lépiote élevée.

Comestibilité :

Bon comestible.

Remarques :

Quelques intoxications alimentaires non constantes et probablement dues à la consommation des variétés suivantes :

Var. bohémica plus grande et à squames brun rouge, orange à la blessure (à rejeter).

Var. venenata poussant dans les abords de décharge et dépotoirs (à rejeter).

Toutes les petites lépiotes dites rougissantes sont toxiques ou mortelles (moins de 10 cm).