

Pholiota flammans





Mauvais mais pas toxique



Brun rouille

Ordre :	Agaricales
Genre :	<i>Pholiota</i>
Caractéristiques du genre :	Lignicole, chair fibreuse, sporée brun clair à ocre. Pied non séparable du chapeau. Blanche.
Sporée :	Brun rouille.

Galerie



Description

Chapeau :	De 3 à 7 cm de diamètre. Jaune soufre Convexe, sec. Orné de squames laineuses jaune d'or.
Chair :	Jaune assez vif. Légèrement visqueuse avec l'humidité, odeur faible, saveur très amère.
Hyménophore :	Lames serrées, jaune vif à brun rouille à maturité.
Pied :	Présence de flocons blancs sur fond jaune orangé.
Anneau :	Zone cortiniforme assez fugace.
Volve :	Sans.
Habitat :	Isolé ou cespiteux sur souches de conifères.
Période de cueillette :	Août à octobre.

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Confusions : *Hypholoma sublateritium* / Hypholome couleur de brique ; *Pholiota squarrosa* / Pholiote écaillée.

Comestibilité : Mauvais mais pas toxique.

Remarques : Champignon qui vaut plus par sa beauté que par sa comestibilité.