

Tylopilus felleus








Mauvais mais pas toxique



Rose brunâtre

Ordre :	Boletales
Genre :	<i>Tylopilus</i>
Caractéristiques du genre :	Hyménophore à tubes longs, mous, facilement séparable de la chair. Stipe robuste à obèse.
Sporée :	Rose brunâtre.

Galerie



Description

Chapeau :

De 5 à 15 cm de diamètre. D'abord convexe puis aplani. Assez épais et de consistance molle avec l'âge. Blanchâtre sale à brunâtre à fauve. Se craquelant avec l'âge. Marge enroulée jeune. (Spécimen jeune).

Chair :

Blanche à pâle immuable. Rosi légèrement à l'air. Saveur amère, désagréable.

Hyménophore :

Tubes blancs devenant caractéristiquement roses avec l'âge. Pores fins, concolores, devenant amples avec l'âge.

Pied : Massif et renflé à la base. Caractérisé par un réseau grossier à mailles allongées plus foncé.
Anneau : Sans.
Volve : Sans.
Habitat : Dans tous types de bois clair en terrain siliceux.

Période de cueillette : Eté et automne. Peut être abondant localement.

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Confusions : *Boletus aereus* / Cèpe tête de nègre ; *Boletus aestivalis* / Cèpe d'été ; *Boletus edulis* / Cèpe de Bordeaux ; *Boletus pinophilus* / Cèpe des pins.

Comestibilité : Mauvais mais pas toxique.

Remarques : Inoffensif. Rendu immangeable par son extrême amertume qui se développe à la cuisson.

Des genres à lames existent en parallèle de ceux à tubes dans l'ordre des Bolétales : *Gomphidius* ; *Paxillus* ; *Omphalotus* ; *Hygrophoropsis*.