

Xerocomus chrysenteron






Comestible



Brun olive

Ordre :	Boletales
Genre :	<i>Xerocomus</i>
Caractéristiques du genre :	Hyménophore en tubes longs, mous, facilement séparable de la chair. Revêtement sec et velouté. Stipe cylindracé.
Sporée :	Brun olive.

Galerie



Description

Chapeau :	De 5 à 10 cm de diamètre. Brun gris à brun rougeâtre. Finement feutré et rapidement craquelé.
Chair :	Molle, jaunâtre et légèrement bleuissante à l'air. Saveur légèrement acidulée.
Hyménophore :	Tubes moyens, échancrés, jaunes verdissant avec l'âge. Pores concolores, irréguliers, bleuissant légèrement au toucher.
Pied :	Souvent tubulaire, mince et courbé. Finement ponctué de rouge sur fond jaune
Anneau :	Sans.
Volve :	Sans.
Habitat :	Sous feuillus et conifères.
Période de cueillette :	Été et automne.

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Confusions : *Xerocomus badius* / Bolet bai ; *Xerocomus ferrugineus* / Bolet ferrugineux ; *Xerocomus rubellus* / Bolet rougeâtre ; *Xerocomus subtomentosus* / Bolet subtomenteux.

Comestibilité : Comestible.

Remarques : Piètre comestible en raison d'une chair molle et sans saveur.

Des genres à lames existent en parallèle de ceux à tubes dans l'ordre des Bolétales :

Gomphidius ; Paxillus ; Omphalotus ; Hygrophoropsis.